Termín (věk dítěte)	Nemoc	*Očkovací látka*
4. den - 6. týden	Tuberkulóza (jen rizikové skupiny)	*BCG vaccine SSI*
3. měsíc (od započatého 9. týdne)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (1. dávka)	*Infanrix hexa **
	Pneumokoková onemocnění (1. dávka)	*Prevenar 20 (ev. Vaxneuvance)*
	Meningokoková onemocnění (1. dávka)	*Bexero*
5. měsíc	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2. dávka - interval min. 2 měsíce od předchozí dávky)	*Infanrix hexa **
	Pneumokoková onemocnění (2. dávka - interval min. 2 měsíce od předchozí dávky)	*Prevenar 20 (ev. Vaxneuvance)*
	Meningokoková onemocnění (2. dávka - interval min. 2 měsíce od předchozí dávky)	*Bexero*
11. - 13. měsíc	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (3. dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky)	*Infanrix hexa **
	Pneumokoková onemocnění (3. dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky)	*Prevenar 20 (ev. Vaxneuvance - mezi 11. - 15. měsícem)*
13. - 18. měsíc	Spalničky, zarděnky, příušnice (1. dávka)	*MMR Vax Pro*
12. - 24. měsíců	Meningokoková onemocnění typu ACWY	*Menquadfi*
5. - 6. rok	Záškrt, tetanus, černý kašel	*Boostrix*
10. - 11. rok	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna	*Boostrix Pollio*
11. - 15. rok	Onemocnění lidským papilomavirem	*Gardasil 9*
14. - 16. rok	Meningokoková onemocnění	*Trumemba, Bexero, Nimenrix*